

DECABION ST

Polvo Soluble



Italvet S A C
Generando confianza



Potente combinación antibiótica de amplio espectro

DECABION ST está indicado para controlar infecciones provocadas por gérmenes sensibles a la combinación Sulfa + Trimetoprim; bacterias Gram + y Gram -

La sulfadiazina es un antimicrobiano de amplio espectro que se usa generalmente en combinación de trimetopim mejorando su distribución sistémica. La combinación de sulfadiazina trimetopim, actúa como antagonistas competitivas por el lugar del PABA (ácido paraaminobenzoico) ante la enzima dihidrofolato reductasa encargados en la producción de ácido fólico bacteriano. Alterando así la síntesis de proteínas y los mecanismos de replicación bacteriana. Las células de mamíferos requieren ácido fólico preformado y no se afectan por las sulfonamidas. El trimetopim tiene un efecto sinérgico con las sulfonamidas. Inhibe con potencia y selectividad la reductasa de dihidrofolato microbiana, la enzima que reduce el dihidrofolato en tetrahydrofolato, la forma necesaria para las reacciones de transferencia de un carbono. La administración conjunta de una sulfonamida y trimetopim introduce en consecuencia bloqueos secuenciales en la vía de biosíntesis del tetrahydrofolato.

Presentación:

Bolsa x 01 kg..

ITALVET SAC
Wsp Ventas: 970 733 765
Mail: ventas@italvetsac.com

Ventajas:

- + Potente combinación sinérgica de antibióticos.
- + Acción Antimicrobiana de choque y residual.
- + Efectividad en tratamientos de problemas digestivos así como respiratorios
- + Efectivo control de Coccidiosis
- + Control eficaz de la mortalidad por desafíos de campo

Composición:

Sulfadiazina sódica.....	80 %
Trimetoprim.....	20 %
Excipientes c.s.p.....	100 %

Dosis y administración:

Dosis: Vía oral en el agua de bebida:

Aves: 15 mg/Kg Peso Vivo por 3 – 5 días consecutivos.

Cerdos: 17mg/kg Peso Vivo por 5 días consecutivos. Terneros, corderos y cabritos: 17mg/kg Peso Vivo por 5 días consecutivos.

Vía oral en el alimento:

Aves: 300g / tonelada alimento por 5 días consecutivos

Intervalo y tiempo de tratamiento:

Administración una vez al día, por un máximo de 5 días o a recomendación del médico Veterinario tratante

Tiempo de Retiro: Porcinos y rumiantes: 10 días Aves: 7 días.
No usar en aves productoras de huevos..

Recomendaciones:

Mantener el producto en su envase cerrado, en un ambiente fresco y seco al abrigo de la luz. entre 15°C y 30° C.

El operador debe manipular el producto utilizando guantes y máscara.