

FLORFENICOL 8%

PREMIX



Potente combinación antibiótica de amplio espectro

FLORFENICOL 8% PREMIX, es una premezcla compuesta de Florfenicol, antibiótico sintético de amplio espectro, derivado del Tianfenicol.

FLORFENICOL 8% PREMIX, actúa bloqueando la síntesis proteica, al ligarse a la porción 50S del ribosoma inhibiendo la enzima peptidil transferasa, produciendo la muerte bacteriana.

Es efectivo contra la mayoría de bacterias Gram positivas y Gram negativas e incluso contra anaerobios, tales como: *Proteus* sp. (incluyendo a especies de *Proteus* indol positivas), *Shigella* sp, *Salmonella* sp., *Corynebacterium* - piogenes, *Streptococcus* sp., *Staphylococcus* sp., *Clostridium* sp, *E coli*, *Pasteurella haemolytica*, *P. multocida*, *Haemophilus somnus*, *Avibacterium paragallinarum*. *Actinobacillus pleuropneumoniae*, enterococos, *Citrobacter*, entre otras.

INDICACIONES:

Aves: Para el tratamiento de infecciones producidas por gérmenes sensibles al Florfenicol como *E. Coli*, *Haemophilus* sp, *Pasteurella* sp, *Salmonella* sp, *Staphylococcus* sp *Proteus mirabilis*, *Salmonella* sp., *Avibacterium paragallinarum* (coriza infeccioso), infecciones de enterobacterias multirresistentes, entre otras.

Cerdos: Control de infecciones respiratorias como el síndrome respiratorio porcino causado por *Streptococcus suis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, *Streptococcus suis*, *Pasteurella multocida*, *Enterococcus* y otras bacterias susceptibles.

Ventajas:

- + Control efectivo de microorganismos Gram+ y Gram-.
- + Excelente digestión en el alimento.
- + Ideal para controlar desafíos respiratorios y digestivos.
- + No altera el consumo de alimento y agua.

Composición:

Florfenicol	8 %
Excipientes c.s.p.....	100 %

Dosis y administración:

TRATAMIENTO PROFILÁCTICO:

Aves: Administrar de 250 g de FLORFENICOL PREMIX 8% por tonelada de Alimento terminado, durante un periodo de 5 a 7 días.

Cerdos: Administrar de 250 g de FLORFENICOL PREMIX 8% por tonelada de alimento terminado, durante un periodo de 5 a 7 días.

TRATAMIENTO TERAPEUTICO:

Aves: Administrar de 500 g a 1 Kg de FLORFENICOL PREMIX 8% por tonelada de alimento terminado, durante un periodo de 5 a 7 días.

Cerdos: Administrar 500 g de FLORFENICOL PREMIX 8% por tonelada de alimento terminado, durante un periodo de 5 a 7 días

Recomendaciones:

Mantener el producto en su envase cerrado, en un ambiente fresco y seco al abrigo de la luz. entre 15°C y 30° C.

Presentación: Bolsa x 25 kg.

ITALVET SAC
Wsp Ventas: 970 733 765
Mail: ventas@italvetsac.com