



TYLVASAN 5%

PMX

ANTIBIÓTICO MACRÓLIDO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

TILVASAN 5% pmx con su potente efecto, logra su acción bactericida en una mínima concentración y en un periodo menor de tiempo. Posee un potente efecto antibacteriano, el cual es 10 veces mayor al de la Tilosina.

La Tilvalosina, presente en **TILVASAN 5%**, se une al ribosoma bacteriano, evitando así el desarrollo de la síntesis proteica, de tal manera que provoca la inhibición de su crecimiento o la muerte bacteriana. Además, el metabolito principal se une a otro receptor del ribosoma bacteriano, asegurando su potente acción. La Tilvalosina alcanza rápidamente altas concentraciones intracelulares. Asimismo, si su concentración en medio extracelular es menor a la intracelular, la droga es liberada desde la célula hacia este medio, potenciando su acción antibacteriana tanto intracelular como extracelularmente.

TILVASAN 5%, es altamente efectivo contra patógenos respiratorios como entéricos, acumulándose en los tejidos de forma selectiva, alcanzando concentraciones pulmonares y en el revestimiento mucoso mayores a las plasmáticas; al concentrarse también en la bilis, garantiza su presencia en el tracto digestivo contra patógenos entéricos.

Ventajas:

- + 10 veces más potente que la tilosina.
- + Alcanza niveles terapéuticos en 30 a 60 minutos.
- + Estimula el Sistema Inmune

ITALVET SAC
Wsp Ventas: 970 733 765
Mail: ventas@italvetsac.com

Composición:

Tilvalosina (como tartrato).....	5 %
Vehículo c.s.p.....	100%

Indicaciones:

Pollos y Pavos: Indicado para el tratamiento y control de enfermedad respiratoria crónica (CRD), saculitis aérea, sinusitis infecciosa causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae* y *Mycoplasma meleagridis* (pavos). Enteritis necrótica asociada a *Clostridium perfringens*, enteritis bacterianas, ORT (*Ornithobacterium rhinotracheale*).

Cerdos: Indicado para el tratamiento y control de micoplasmosis, neumonía micoplásmica (enzoótica) causada por *M. hyopneumoniae*, enteropatía proliferativa porcina (EPP), ileitis porcina causada por *Lawsonia intracellularis*, Disentería porcina causada por *Brachyspira hyodysenteriae*, colitis causada por *B. pilosicoli*.

Dosis y administración:

1 a 2 Kg de **TILVASAN 5%** / TM de alimento
 Otros: Consulte a su médico veterinario.

Periodo de retiro: 2 días.

Recomendaciones:

Mantener el producto en su envase cerrado, en un ambiente fresco y no exponer a la luz.

Presentación: Bolsas de 25 Kg.